



CZYNNIK

Wirus odry
łatwo się rozprzestrzenia



OBJAWY


- gorączka
- ostry ból gardła
- wodnisty katar
- suchy kaszel
- zapalenie spojówek
- świątłowstręt
- białe wykwity w jamie ustnej
- czerwona grudkowa wysypka na twarzy/ciele



POWIKŁANIA

- biegunka (dzieci)
- zapalenie ucha środkowego (dzieci)
- zapalenie krtani i tchawicy (krup)
- zapalenie oskrzeli
- zapalenie płuc
- zapalenie wątroby (dorośli)
- ostre zapalenie mózgu
- podostre stwardniające zapalenie mózgu

**RYZIKO CIĘŻKIEGO PRZEBIEGU CHOROBY Z ZAPALENIEM PŁUC I/LUB OSTRYM ZAPALENIEM MÓZGU
JEST WIĘKSZE U PACJENTÓW Z NIEDOBREM ODPORNOŚCI**



PROFILAKTYKA

- szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce)
- szczepionka „żywa” (z osłabionymi wirusami)

2 dawki: w 13-15 r.ż. i 6 r.ż.

osoba dorosła (nieszczepiona): 2 dawki w odstępie 4 tyg.

DWIE DAWKI SZCZEPIONKI ZAPEWNIĄ NIEMAL 100% OCHRONĘ!

EPIDEMIOLOGIA

bardzo zaraźliwa i poważna choroba

6 razy bardziej zaraźliwa niż grypa

nadal stanowi zagrożenie,
może powodować epidemie



zaszczepienie powyżej 95%
populacji zapewnia odporność
zbiorowiskową



odporność zbiorowiskowa
chroni dzieci i dorosłych, którzy
nie mogą być zaszczepieni



u 1 na 5 przypadków choroba
będzie miała poważny przebieg
lub nastąpią powikłania