



Starosta Makowski oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że w celu ograniczenia ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania wirusa ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie należy bezwzględnie przestrzegać stosowne zakazy i nakazy (zasady bioasekuracji) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych poprzez:

- utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
- zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem dzików jak również zwierząt domowych;
- zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni), zwierząt domowych i owadów;
- zachowanie podstawowych zasad higieny:
 - używanie oddzielnej odzieży ochronnej i narzędzi w pomieszczeniach dla świń,
 - odkażanie rąk i obuwia, z użyciem zarejestrowanych środków działających wirusobójczo;

- okresowe i doraźne czyszczenie i odkażanie narzędzi używanych przy obsłudze świń, z zastosowaniem środków o działaniu wirusobójczym;
- nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego, w przypadku zbóż pozyskanych na obszarach objętych ograniczeniami II oraz III, skarmianie świń tym zbożem po uprzednim co najmniej 30 dniowym składowaniu jej w miejscu niedostępnym, odpowiednio zabezpieczonym przed zwierzętami domowymi i dzikami;
- słoma wykorzystywana na ściótkę dla świń, pochodząca z obszaru objętego ograniczeniami II lub III, przed jej postaniem składowana jest przez co najmniej 90 dni w miejscu niedostępnym dla dzików;
- zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
- rezygnacja z udziału w polowaniach oraz przestrzeganie bezwzględneho zakazu wnoszenia dziczyzny na teren gospodarstwa;
- uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świny.

Ponadto, należy bezwzględnie ograniczyć swobodny wybieg psów. Wolno biegające psy w obrębie kompleksów leśnych i łąk mogą być przyczyną zawleczenia wirusa ASF do gospodarstwa.

DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa
Spraw Społecznych i Obywatelskich
mgr inż. Mariusz Andrzej Sośnicki